

Instrucciones de colonoscopia (GOLYTELY)

Fecha del procedimiento: _____ Seguir: _____

El centro de cirugía llamará con la hora 2 días antes de la fecha de su procedimiento

FACILITY	ADDRESS	PHONE#
ORANGE CITY SURGERY CENTER	975 Town Center Dr, Orange City FL	386-456-5247
LAKE MARY SURGERY CENTER	460 ST Charles Court, Lake Mary FL	407-585-0263
FHC PLANS SURGERY CENTER	2777 Enterprise Rd, Orange City FL	386-481-6282
FL HOSPITAL FISH MEMORIAL	1055 Saxon Blvd, Orange City FL	386-917-5000
CENTRAL FLORIDA REGIONAL HOSPITAL	1401 West Seminole Blvd, Sanford FL	888-894-2106

INSTRUCCIONES:

- Continuar tomando medicamentos de rutina, incluida la presión arterial y medicamentos para el corazón.
- Si es diabético, solo tome la mitad de su dosis habitual la mañana del procedimiento.
- Antes de suspender cualquier anticoagulante, hable con su proveedor de medicamentos.
- Pare de tomar Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta durante 5 días antes del procedimiento.
- Pare de tomar Pradaxa, Eliquis y Xarelto durante 2 días antes del procedimiento.
- 5 días antes suspende cualquier suplemento de hierro, vitaminas o suplementos herbales.
- 5 días antes, no tome: Aleve, Motrin, Naproxen, Ibuprofen - Tylenol es seguro de usar.
- **Debe tener un miembro familiar o amigo conducir a y desde la instalación. NO SE PERMITE NINGÚN TIPO DE SERVICIO DE TAXI.**

DÍA ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

¡No coma ningún alimento sólido todo el día antes del procedimiento!

Ten una dieta líquida clara durante todo el día. Evite los líquidos que son de color rojo o morado, como la uva roja o el jugo de arándano. Evite TODOS los productos lácteos y jugos con pulpa, como el jugo de naranja o pomelo. Puede beber líquidos claros (SIN COLORES ROJOS / OSCUROS) hasta 3 horas antes del procedimiento. En la marca de 3 horas, nada por la boca incluyendo agua. Puede tomar cualquier medicamento necesario con un pequeño sorbo de agua.

Los líquidos claros incluyen lo siguiente:

Sopas: caldo (pollo, carne de res o vegetal)

Zumos: jugo de uva blanco, manzana, etc.

Postres: gelatina, hielo italiano, paletas heladas, etc.

Bebidas: té, Kool-Aide, agua, café negro

Bebidas deportivas: Powerade, Gatorade, Propel

If your procedure is before 12PM	If your procedure is after 12PM
1. A las 5:00 PM comience a beber la solución Golytely. Bebe un 8 oz vaso de solución cada 15 minutos hasta que termine la mitad del recipiente.	1. A las 5:00 PM comience a beber la solución Golytely. Bebe un 8 oz vaso de solución cada 15 minutos hasta que termine la mitad del recipiente.
2. A las 11:00 PM termine de beber el resto de la solución Golytely, 8oz de vidrio cada 10-15 minutos.	2. A las 6:00 a.m. termina de beber el resto de la solución Golytely, 8 oz. vaso cada 10-15 minutos.

Por favor permita un aviso de 5 días hábiles para la cancelación o habrá un cargo de \$200.